

Tiroid Kanseri ile İlgili Yanlıřlar

Genel popülasyonda palpasyon ile saptanabilen tiroid nodülü sıklığı % 10 kadardır.	YANLIř
Bir tiroid nodülü olan bir hastada tiroid kanseri olasılığı % 20 civarındadır.	YANLIř
Tiroid kanseri olasılığı milyon nüfusta 1-2 civarında bulunmuřtur.	YANLIř
Genel popülasyonda ultrasonografi ile tiroid nodülü saptama olasılığı % 10 kadardır.	YANLIř
Tiroid nodüllerinin yarısına yakını tiroid kanseridir.	YANLIř
Tiroid kanserleri genel olarak sürvisi kısa kanserlerden birisidir.	YANLIř
Tiroid kanseri erkeklerde daha sık görülür.	YANLIř
Tiroidde en sık karřılařılan karsinom folliküler karsinomdur.	YANLIř
Tiroid kanserlerinde ailesel geiř özelliđi olan tipi papiller tiroid kanseridir.	YANLIř
Tiroid kanseri olan hastaların çođunda fizik muayenelerinde nodül dıřında bir özellik saptanamaz.	YANLIř
Tiroid kanserlerinden çoklu endokrin neoplazi komponenti olan anaplastik tiroid kanseridir.	YANLIř
Differansiye tiroid kanserli olgularda tercih edilen operasyon biçimi subtotal tiroidektomidir.	YANLIř
Tiroid papiller kanserli olgularında en önemli izlem parametresi serum kalsitonin seviyesidir.	YANLIř
Tiroid papiller kanserinin tedavisinde en etkin tedavi boyuna uygulanan eksternal radyoterapidir.	YANLIř
Tiroid papiller kanserli hasta ömür boyu antitiroid ilaç tedavisi almalıdır.	YANLIř
Tiroid papiller kanserli olgularda cerrahi tedavinin amacı tiroid neoplazinin total olarak ortadan kaldırılmasıdır.	YANLIř
Tiroid papiller karsinomunda 5 yıllık sürvi ortalama % 50 kadardır.	YANLIř
Ailesinde medüller tiroid kanseri anamnezi olan bir kiři kalsitonin ile tarama yapılmalıdır.	YANLIř
Medüller tiroid kanseri tanılı hastalarda tiroid operasyonu sonrası radyoaktif iyot tedavisi verilmelidir.	YANLIř
Medüller tiroid kanserli olguların izlemi için tiroglobulin ölçümü yapılmalıdır.	YANLIř
Tiroid kanserlerinden multipl endokrin neoplazi komponenti olabilen papiller tiroid kanseridir.	YANLIř
Medüller tiroid kanserli olguların izlemi için tiroglobulin ölçümü yapılmalıdır.	YANLIř
Tiroid medüller ca en etkin tedavi yöntemi kemoterapidir.	YANLIř
Tiroid medüller ca en etkin tedavi yöntemi cerrahidir.	YANLIř
Tiroid medüller kanseri tanısı ince iđne aspirasyon biyopsisi ile konulamaz.	YANLIř

Prof. Dr. Erdi ERTÜRK

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Bağlarbaşı Mah. 1. Sedir Sok. Mediloft Dr Ofisleri No:15/12 Osmangazi 16160, Bursa

Tel: 224 246 00 99 WA: 0531 78 66 888

e-posta: drerdincerturk@gmail.com

web: www.erdincerturk.com

Anaplastik tiroid kanseri sürvisi en uzun tiroid kanseridir.	YANLIŞ
Anaplastik tiroid kanserli hastalarda genellikle nodülün çevresindeki dokulara baskı ve invazyon bulguları gözlenmez.	YANLIŞ
Anaplastik tiroid kanserli hastalar multipl endokrin neoplazi (MEN) yönünden değerlendirilmelidir.	YANLIŞ
Tiroidin anaplastik karsinomasında hastalarda sıklıkla tirotoksikoz bulunur.	YANLIŞ