

Hiperkalsemi ile ilgili yanlışlar

<i>Hiperkalsemili hastalarda sıklıkla hiçbir belirti yoktur.</i>	YANLIŞ
<i>Laboratuvar tetkiklerinde hiperkalsemi saptanmış kişilerin ok büyük kısmında hiperkalsemi semptomu bulunmaz.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperkalsemi ile gelen kişide öncelikle malignite ekarte edilmelidir.</i>	YANLIŞ
<i>Maligniteye baėlı hiperkalsemili hastalarda ürolithiazis sık görülür.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperkalsemi saptanan hastanın etyolojisini saptamada en yararlı tetkik serum fosfor ölçümüdür.</i>	YANLIŞ
<i>En sık hiperkalsemi sebebi olan malignite kolon kanseridir.</i>	YANLIŞ
<i>Kadınlarda hiperkalsemiye sık sebep olan malignitelerden birisi de over karsinomasıdır.</i>	YANLIŞ
<i>Maligniteye baėlı hiperkalsemili hastalarda sıklıkla hiçbir belirti yoktur.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperparatiroidiye baėlı hiperkalsemili hastalarda sıklıkla ok yüksek serum kalsiyum düzeyi saptanır.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperkalsemili hastada osteoporoz da varsa primerden daha ok sekonder hiperparatiroidi düşünölmeldir.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperkalsemili bir hastada etyoloji saptanamadı ise serum kalsitonin ölçümü de yapmak gerekir.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperparatiroidiye baėlı hiperkalsemili hastalarda serum kalsiyum seviyesi maligniteye baėlı hiperkalsemili hastalarda genellikle daha yüksek bulunur.</i>	YANLIŞ
<i>Yaşlı hastalarda hiperkalsemi saptandığında öncelikli olarak akla getirilmesi gereken hematolojik malignitelerden birisi kronik myeloid lösemidir.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperkalsemi saptanan bir hastada maligniteye baėlı olduėu düşünölüyorsa parathomon related peptid ölçümü yapılmalıdır.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperkalsemili bir hastada serum PTH yüksek bulunursa maligniteye baėlı hiperkalsemi ekarte edilmiş olur.</i>	YANLIŞ
<i>D vitamin toksisitesine baėlı hiperkalsemide serum fosfor seviyesi düşük olma eğilimindedir.</i>	YANLIŞ
<i>Serum kalsiyum seviyesi yüksek bir kişide olası nedenlerinden birisi kronik böbrek yetmezliğine baėlı sekonder hiperparatiroididir.</i>	YANLIŞ
<i>D vitamini toksisitesi 1-25 dihidroksi kolekalsiferol göre daha sıklıkla 25OH kolekalsiferol</i>	YANLIŞ
<i>Hiperkalsemili bir hastada serum parathormon seviyesi ok yüksek ise büyük olasılıkla parathormon salan paraneoplastik sendrom söz konusudur.</i>	YANLIŞ
<i>Maligniteye baėlı hiperkalsemide sıklıkla sebep paraneoplastik olarak ektopik parathormon salgılanmasıdır.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperparatiroidiye baėlı hiperkalsemili hastalarda serum kalsiyum seviyesi maligniteye baėlı hiperkalsemili hastalara göre daha yüksek olma eğilimindedir.</i>	YANLIŞ

<i>Primer hiperparatiroidide alkale fosfataz seviyesinde düşme gözlenir.</i>	YANLIŞ
<i>Primer hiperparatiroidili hastalarda günlük idrarla kalsiyum atılımında azalma görülür.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperkalsemili hastaların etyolojik tanısına yaklaşım algoritminde serum kalsitonin ölçümü gerekli olabilir.</i>	YANLIŞ
<i>Primer hiperparatiroidili hastalarda multiple endokrin neoplazinin eşlik edebildiği patoloji küçük hücreli akciğer kanseridir.</i>	YANLIŞ
<i>Malignitelere bağlı hiperkalsemi sıklıkla kemik metazetazına sekonder gelişir.</i>	YANLIŞ
<i>Primer hiperparatiroidili hastalarda osteoporoz beklenmez.</i>	YANLIŞ
<i>Hipotiroidi etkin tedavi edilmezse osteoporozza yol açabilir.</i>	YANLIŞ
<i>Postmenapozal osteoporoz hiperkalsemi nedenlerindedir.</i>	YANLIŞ
<i>Hiperkalsemi saptanmış bir kişide etyolojiye yönelik olarak yapılacak en önemli tetkik serum D vitamini seviyesi ölçümüdür.</i>	YANLIŞ
<i>Primer hiperparatiroidi tanısı konulan bir hasta kalsimimetik ilaçlar ile tedavi edilmelidir.</i>	YANLIŞ
<i>Primer hiperparatiroidide medikal tedavi çok etkilidir, genellikle başka tedavi gerekli olmaz.</i>	YANLIŞ
<i>Acil hiperkalsemi durumunda tiazid gurubu diüretikler tercih edilir.</i>	YANLIŞ
<i>Acil hiperkalsemi tedavisinde kullanılan diüretikler tiazide gurubu diüretiklerdir.</i>	YANLIŞ
<i>Acil hiperkalsemi durumunda parenteral bifosfonat infüzyonu ile genellikle saatler içerisinde serum kalsiyum seviyesi normale getirilir.</i>	YANLIŞ
<i>Acil hiperkalsemi tedavisinde en çabuk etki gösteren ajanlar bifosfonatlardır.</i>	YANLIŞ
<i>Primer hiperparatiroidili hastalarda öncelikle medikal tedavi tercih edilir.</i>	YANLIŞ
<i>Acil hiperkalsemi durumunda diüretik parenteral sıvı öncesinde kullanılmalıdır.</i>	YANLIŞ
<i>Primer hiperparatiroidili hastalarda hiperkalsemiyi düzeltmek için glukokortikoidler etkin olarak kullanılmaktadır.</i>	YANLIŞ
<i>Primer hiperparatiroidide medikal tedavi genellikle yeterli olur.</i>	YANLIŞ
<i>Acil hiperkalsemi tedavisinde loop diüretikler kullanılmamalıdır.</i>	YANLIŞ